Tisztelt horgásztársak!

Megtörtént a 2014.-évi első haltelepítés az egyesület bányataván!

Kedves Horgásztársak!

2014.03.20-án 506 kg pontyot telepítettünk, 650 Ft/kg tóparti egységáron.

A halállományunk egészségügyi vizsgálatát kezdeményeztük 2014.03.18-án Budapesten.

E-mailban az alábbi tájékoztatást kaptuk:

"A 2014.03.18-án Igazgatóságunkba behozott és M2014-10011640 sz. iktatott halak vizsgálat során azok testfelületén közepes/súlyos (egyedenként változó) Ichthyobodo necatrix (Costia necatrix) egysejtű parazitafertőzést diagnosztizáltunk.
Javasoljuk az állomány 4g/m3 dózisban történő rézoxikloridos kezelésének az elvégzését a parazita fertőzés leküzdése céljából."

A részoxikloridos kezelés első ütemét 2014.03.22-én elvégeztük.

A halegészségügyi kezelést 4-5 nap múlva megismételjük.

A kezelésre használt rézoxiklorid miatt horgászati tilalmat rendeltünk el 2014.04.05. 00.06 óráig.

Kérem a horgásztársakat, hogy a hasonló fertőzések elkerülése érdekében halat ne tegyenek a Bányatóba. Főleg ne hordják be a halakat a Száraz-érből!

A telepítés elhalasztását nem javasolta a vizsgálatot végző Igazgatóság..

Üdvözlettel: Vezetőség

"2014.03.22 -én fásítást végeztünk a Bányatónál.

Telepítettünk kőris, gömbkőris, szil és boróka fafajokat.
Mezőkovácsházi Új Alkotmány Mezőgazdasági Szövetkezet anyagilag és az ültetésbe is támogatta egyesületünket.
Ültetőgödör fúrásával Almási Tibor segítette munkánkat.
A segítséget mindenkinek köszönjük!"

A 2014.03.18-án Igazgatóságunkba behozott és M2014-10011640 sz. iktatott halak vizsgálat során azok testfelületén közepes/súlyos (egyedenként változó) Ichthyobodo necatrix (Costia necatrix) egysejtű parazitafertőzést diagnosztizáltunk.

Javasoljuk az állomány 4g/m3 dózisban történő rézoxikloridos kezelésének az elvégzését a parazita fertőzés leküzdése céljából. A rézoxokloridot a munkaegészségügyi előírásoknak megfelelően (gumikesztyű, szájmaszk, stb.) feloldott állapotban egyenletesen kell szétlocsolni a tavon.

Javasoljuk továbbá, hogy szivattyú segítségével csalják oda a súlyosabban fertőzött egyedeket a tó egyik felébe, lehetőleg a sekélyebbik felébe és azt a területet megbecsülve (kb.0,5 ha) végezzék el a kezelést, amit 4-5 nap múlva ismételjenek meg.

A rézoxiklorid még tízszeres dózisban sem toxikus a halakra, azok lárváira sem.

A részletes vizsgálati eredményt legkésőbb a jövő hét elején postázzuk.

Üdvözlettel:

dr. Láng Mária